

Patiënteninformatie

Echogeleide infiltratie



Echogeleide infiltratie

Afdeling Radiologie, route 1.4
Telefoon (050) 524 5345

Algemeen

- Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig legitimatiebewijs mee.
- Bent u verhinderd, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Radiologie.

Inleiding

Uw arts heeft in overleg met u een afspraak gemaakt voor de behandeling van een slijmbeursontsteking of peesontsteking middels een echogeleide infiltratie. Deze behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie. In deze folder leest u hoe de behandeling verloopt. De informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie van de arts.

Echogeleide infiltratie

Bij een echogeleide infiltratie spuit de radioloog een medicijn (Kenacort) in op de plaats van de ontsteking. 'Echogeleid' wil zeggen dat het prikken gebeurt met behulp van echografie. Echografie is een onderzoekstechniek waarbij we met behulp van ultrageluidsgolven (voor de mens niet hoorbaar) organen of structuren zichtbaar maken op een beeldscherm.

Vorbereiding

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Sintrom, Ascal) geeft u dit dan door aan de aanvragend arts, zodat hij/zij het onderzoek op een later tijdstip kan aanvragen. Na overleg met uw arts stopt u 3 dagen voor de behandeling met Sintrom. Ascal mag u blijven gebruiken.

Let op

Als het onderzoek plaatsvindt terwijl u bloedverduunners gebruikt, meldt u dit dan aan de afdeling Radiologie. Bij gebruik van bloedverduunners zal de prikplaats langer blijven bloeden en dit vereist dus meer zorg.

Bij patiënten met diabetes mellitus kan de bloedsuikerspiegel onregelmatig raken door het inspuiten van het medicijn (corticosteroïd). Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw huisarts, internist of diabetesverpleegkundige.

Behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. De laborant komt u ophalen uit de wachtkamer en brengt u naar een kleedhokje. Naasten kunnen in principe niet bij de behandeling aanwezig zijn.

In de kleedkamer ontdoet u zich van alle kleding die het te prikken gebied bedekt. Afhankelijk van de prikplaats neemt u plaats op een stoel of op de behandeltafel. De radioloog kijkt eerst met de echokop om de plaats van het prikken te bepalen. Dan wordt het te prikken gebied gedesinfecteerd. De radioloog geeft een prik op de te behandelen plaats en het corticosteroïd (Kenacort) wordt ingespoten. Daarna wordt de prikplaats afgedekt met een pleister.

Tijdsduur

De echogeleide infiltratie duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

U mag na de behandeling zelf naar huis rijden. Wel is het verstandig de rest van de dag rustig aan te doen.

Uitslag

Na ongeveer 4 tot 6 weken heeft u een controleafspraak bij uw behandelend specialist. Deze controleafspraak maakt u zelf na ontvangst van de afspraak voor de echogeleide infiltratie.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder *Uw tevredenheid, onze zorg*.

Tot slot

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie (050) 524 5345. De afdeling is op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur telefonisch bereikbaar.

Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl

