

# Reumatologie Martini Ziekenhuis Groningen

## Patiënteninformatie Ixekizumab (Talz®)



Ixekizumab behoort tot de groep van reuma-remmende middelen. Dat betekent dat deze middelen in staat zijn de activiteit van het reumaproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. Het onderdrukken van de klachten (pijn en stijfheid), verschijnselen (gewrichtszwelling) en het verbeteren van de algemene conditie.
2. Het beperken van de gewrichtsbeschadiging.

Ixekizumab wordt aan u voorgeschreven omdat andere medicijnen, die uw reumatoloog u tegen deze ziekte al eerder voorschreef, niet voldoende effectief zijn of omdat u ze niet kunt verdragen.

### Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel ook altijd de officiële bijsluiter goed te lezen.

### Wat is Ixekizumab (Talz®)?

Ixekizumab behoort tot een groep geneesmiddelen die interleukineremmers (IL-remmers) worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt doordat het de activiteit van een eiwit genaamd IL-17A neutraliseert. Dit eiwit komt in grotere hoeveelheden voor bij aandoeningen als psoriasis en artritis psoriatica.

### Moment van werking

Meestal begint de werking al nadat u een aantal injecties heeft gehad. Vaak wordt na 3 maanden het maximale effect bereikt, soms duurt dat nog iets langer.

Nadat de ziekte minstens een half jaar rustig is, wordt geprobeerd de medicatie weer langzaam af te bouwen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat dit over het algemeen probleemloos kan.

### Hoe wordt dit geneesmiddel toegediend?

Ixekizumab wordt gegeven per injectie onder uw huid.

- Bij de behandeling van patiënten met artritis psoriatica die ook matige tot ernstige plaque psoriasis hebben: de eerste dosis is 160mg (twee injecties van 80 mg). Daarna gebruikt u een dosis van 80 mg in de weken 2, 4, 6, 8, 10 en 12. Vanaf week 12 gebruikt u iedere 4 weken een dosis van 80 mg.
- Bij de behandeling van patiënten met artritis psoriatica zonder matige tot ernstige psoriasis: De eerste dosis is 160mg (twee injecties van 80 mg). Na de eerste dosis krijgt u elke vier weken 80 mg.

### Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Sommige kunnen ernstig zijn en een behandeling vereisen.

- **Allergische reacties:** over het algemeen mild tot matig en in zeldzame gevallen ernstiger. De symptomen van zulke reacties zijn meestal uitgebreide huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of lage bloeddruk. Bij deze symptomen moet u met spoed contact opnemen met uw huisarts of de polikliniek.
- **Infecties:** door de behandeling met Ixekizumab kunt u gevoeliger zijn voor infecties:
  - warme, rode en pijnlijke huid of pijnlijke blaren
  - urineweginfectie
  - luchtweginfectie
  - maagdarminfectie
  - ontstoken kiezen en tanden en andere mondproblemen
  - koorts



- reacties op de injectieplaats (rode huid, pijn)
- blaasjes in mond en op de huid en slijmvliezen (herpes simplex)
- misselijkheid
- mondspruw (orale candidiasis)
- verschijnselen van lage aantallen witte bloedcellen, zoals koorts, keelpijn of mondzweren door infecties (neutropenie)
- voetschimmel (tinea pedis)

### **Wanneer mag het niet worden gebruikt**

Het gebruik van Ixekizumab wordt afgeraden bij een infectie of abscessen. Twijfelt u of u een infectie heeft? Overleg dan met uw huisarts. Als u een infectie heeft, dan is het belangrijk om het toedienen van de injectie uit te stellen totdat de infectie over is.

Overleg ook met uw reumatoloog als u de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa heeft.

### **Controles**

Bloedcontroles zijn niet anders dan wat u gewend was tijdens de behandeling van uw ziekte.

Wanneer u de afspraak niet opvolgt om volgens voorschrift het bloed te laten controleren, krijgt u het dringend advies om geen Ixekizumab te gebruiken.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

De gevolgen van Ixekizumab voor de zwangerschap zijn niet bekend, daarom wordt het gebruik van Ixekizumab afgeraden bij een kinderwens (ook bij mannen). Het is belangrijk om zwangerschap te voorkomen als u Ixekizumab gebruikt. Gebruik tenminste tot en met drie maanden na het gebruik van de laatste dosering van Ixekizumab anticonceptie. Raakt u toch zwanger tijdens de behandeling? Waarschuw dan uw arts. Het is onbekend of het medicijn overgaat in de moedermelk. Borstvoeding wordt dan ook afgeraden.

### **Operaties en tandheelkundige ingrepen**

Als een geplande operatie plaatsvindt, hoeft de therapie niet te worden onderbroken. Tenzij er sprake is van een operatie met een verhoogd infectierisico. U kunt weer beginnen met Ixekizumab als er geen tekenen van infecties zijn of complicaties zijn.

### **Vaccinatie**

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Denkt u vaccinaties nodig te hebben in verband met verre reizen? Overleg dan met uw behandelend reumatoloog of verpleegkundig specialist.

### **Bron**

- Farmacotherapeutisch kompas
- Bijsluiter ixekizumab Eli Lilly Nederland B.v.