

Reumatologie Martini Ziekenhuis Groningen

Patiënteninformatie Ciclosporine (Neoral®)

Ciclosporine behoort tot de groep van reumaremmende middelen. Dat betekent dat deze middelen in staat zijn de activiteit van het reumaproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. Het onderdrukken van de klachten (pijn en stijfheid), verschijnselen (gewrichtszwelling) en het verbeteren van de algemene conditie.
2. Het beperken van de gewrichtsbeschadiging.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Heeft u na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog of apotheker.

Hoe kunt u dit geneesmiddel het beste innemen?

De totale dagdosis moet u verdeeld over twee doses innemen. De capsules moeten heel doorgeslikt worden met water. Bij voorkeur voor de maaltijd.

Moment van werking

Na het starten met Ciclosporine duurt het minimaal acht tot twaalf weken voordat u zich wat beter voelt. Uw arts kan u adviseren ook nog andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen

- hoge bloeddruk
- achteruitgang nierfunctie

Beide bijverschijnselen verdwijnen meestal na verminderen van de dosis of als u (tijdelijk) stopt met het innemen van dit geneesmiddel. Soms moet de hoge bloeddruk behandeld worden met andere medicijnen.

Ander bijwerkingen zijn:

- overmatige haargroei
- zwelling tandvlees
- misselijkheid en/of braken
- trillen van handen
- spierkrampen
- leverfunctiestoornissen
- hoofdpijn
- vocht vasthouden

Controles

Om in een vroeg stadium eventuele bijwerkingen te kunnen opsporen vinden er regelmatig bloedcontroles plaats. De eerste drie maanden één keer per maand, daarna één per twee maanden. Ook controleert de huisarts uw bloeddruk. Als u last krijgt van bijwerkingen, dan is het van belang om contact op te nemen met uw behandelend arts. Wanneer u uw bloed niet laat controleren, krijgt u het dringend advies om geen Ciclosporine te gebruiken.

Aanvullende informatie

Ciclosporine kan niet altijd worden gecombineerd met andere medicijnen. Als uw huisarts of specialist andere medicijnen voorschrijft, vertel deze dan altijd dat u Ciclosporine gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger wil worden, is het wel verstandig om dit met uw behandelend arts te bespreken. Borstvoeding is niet toegestaan als u Ciclosporine gebruikt.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Bij operaties en tandheelkundige ingrepen hoeft niet u te stoppen met Ciclosporine.

Vaccinaties

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Tevens wordt 1x per 5 jaar een pneumococcenvaccinatie aanbevolen. Dit kunt u via de huisarts regelen. De pneumococcenvaccinatie kan wel kosten met zich meebrengen. Wanneer u vaccinaties denkt nodig te hebben, dan is het van belang om te overleggen met de GGD.

Bron

- Farmacotherapie Kompas
- Richtlijn NVR 2004