

Reumatologie Martini Ziekenhuis Groningen

Patiënteninformatie Abatacept (Orencia®) Infuus

Abatacept behoort tot de groep van reuma-remmende middelen, dat wil zeggen dat deze middelen in staat zijn de activiteit van het reumaproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. Het onderdrukken van de klachten (pijn en stijfheid), verschijnselen (gewrichtszwelling) en het verbeteren van de algemene conditie.
2. Het beperken van de gewrichtsbeschadiging.

Hoe werkt Abatacept?

Abatacept is een eiwit dat specifieke eiwitten op lichaamscellen herkent en zich daaraan bindt. Abatacept verhindert dat bepaalde witte bloedcellen (de T-cellen) een afweerreactie tegen lichaamseigen cellen in uw gewrichten in werking zetten of in stand houden. Hierdoor zal de activiteit van uw reuma afnemen of zelfs verdwijnen en zult u beter kunnen functioneren.

Over de veiligheid van het middel op de langere termijn bij reumatoïde artritis zijn voornamelijk beperkte gegevens beschikbaar. De rol van Abatacept bij het ontwikkelen van kanker is niet bekend. Het is van belang dat patiënten een speciale waarschuwingskaart dragen, als zij met Abatacept behandeld worden.

Hoe wordt Abatacept toegediend?

Abatacept wordt gegeven via een infuus in de ader in een dosering van 500, 750 of 1000 mg, afhankelijk van het lichaamsgewicht. Het tweede infuus wordt na twee weken gegeven en daarna één keer per vier weken. De duur van het infuus is ongeveer dertig minuten. De infusen worden in principe in dagbehandeling gegeven. Gedurende de infusie wordt u geobserveerd en zal regelmatig uw bloeddruk en hartslag worden gecontroleerd. Als er bijwerkingen optreden is het mogelijk dat de toediening tijdelijk wordt stopgezet. Wanneer er zich in deze tijd geen ernstige bijwerkingen voordoen kunt u daarna naar huis.

Moment van werking

Het aanslaan van de behandeling met Abatacept is meestal binnen enkele weken merkbaar. Vaak verbetert de reactie na elk volgend infuus.

Mogelijke bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Sommige kunnen ernstig zijn en een behandeling vereisen. Sommige patiënten die behandeld werden met Abatacept kregen allergische reacties na de toediening van het geneesmiddel. Deze waren mild tot matig, en soms, in zeldzame gevallen ernstiger. De symptomen van zulke reactie zijn meestal huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of lage bloeddruk. Deze symptomen zullen het meest optreden bij de eerste of de tweede toediening van het geneesmiddel. Andere bijwerkingen kunnen veel later optreden.

Raadpleeg uw arts wanneer u de volgende klachten heeft:

- kortademigheid
- pijn bij urineren of heel vaak kleine beetjes urineren
- wijzigingen in de manier waarop uw hart klopt, bijvoorbeeld als u merkt dat het sneller klopt
- een licht gevoel in het hoofd
- vermoeidheid
- heesheid
- hoesten
- koorts
- huiduitslag

- jeuk
- ontstoken wondjes, steenpuisten
- infecties: door de behandeling met Abatacept kunt u gevoeliger zijn voor infecties. Wanneer u bepaalde klachten ervaart na een infuus, aarzel dat niet om contact op te nemen met de behandelend reumatoloog.

Wanneer mag Abatacept niet worden gegeven?

Het gebruik van Abatacept wordt afgeraden bij een infectie of abscessen. Als u twijfelt of u een infectie heeft, overleg dan met uw huisarts. In geval van een infectie, is het van belang om het toedienen van het infuus tenminste twee weken uit te stellen.

Neemt u dan zelf contact op met de reumaconsulent voor een nieuwe afspraak, telefoonnummer: (050) 524 6955.

Controles

Bloedcontroles zijn niet anders dan wat u gewend was tijdens de behandeling van uw ziekte. Wanneer u de afspraak niet opvolgt om volgens voorschrift het bloed te laten controleren, krijgt u het dringend advies om geen reumamedicatie te gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

De gevolgen van Abatacept voor de zwangerschap zijn niet bekend, daarom wordt het gebruik van Abatacept afgeraden bij kinderwens (ook bij mannen). Het is van belang om zwangerschap te voorkomen gedurende het gebruik van Abatacept. Anticonceptie tijdens het gebruik van Abatacept is van belang tot en met zes maanden de laatste dosering. Wordt u zwanger tijdens de behandeling? Neem dan contact op met uw arts. Het is onbekend of Abatacept, het werkzame bestanddeel, overgaat in de moedermelk. Borstvoeding wordt dan ook afgeraden.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Een voorgenomen operatie of tandheelkundige ingreep moet bij voorkeur plaatsvinden twee maanden voor het volgend infuus. Als dat niet mogelijk is, dan adviseren wij u om met de chirurg of tandarts te overleggen of u onder bescherming van een antibioticum geholpen moet worden. Het volgende infuus mag volgens het schema weer worden gegeven als de wond goed genezen is en geen tekenen van infectie (meer) vertoont.

Vaccinatie

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Tevens wordt 1x per 5 jaar een pneumococcenvaccinatie aanbevolen. Dit kunt u via de huisarts regelen. De pneumococcenvaccinatie kan wel kosten met zich meebrengen

Wanneer u in verband met reizen vaccinaties denkt nodig te hebben, dient u te overleggen met de GGD.

Bron

- Farmacotherapeutisch Kompas Productinformatie Bristol Myers en Squibb
- NVR Biologicals richtlijn verantwoordelijk gebruik van Biologicals jan.2011/update 2014
- Productinformatie Bristol Myers en Squibb