

Patienteninformatik



Mantoux test



Mantoux test

Afdeling Longfunctie, route 1.5
Telefoon (050) 524 5392

Algemeen

- Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en identiteitsbewijs mee.
- Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de afdeling Longfunctie.
- Als u koorts heeft of 2 weken voor het onderzoek een operatie heeft ondergaan, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie.

Inleiding

In overleg met uw arts laat u zich op de afdeling Longfunctie testen op tuberculose (tbc). De test is bekend onder de naam mantouxtest. Deze folder informeert u over de test en is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw behandelend arts en/of de longfunctieanalist ontvangt.

Mantouxtest

Via de mantouxtest kan een besmetting (infectie) met tuberculose (tbc) worden opgespoord. Deze test kan echter niet aantonen of u ook tbc heeft. Daarvoor moet een röntgenfoto van de longen worden gemaakt. De mantouxtest wordt gebruikt bij personen, geboren vanaf 01-01-1945, die niet eerder een positieve test hadden of niet met BCG zijn ingeënt.

Voor de test hoeft u geen voorbereidingen te treffen of een afspraak te maken. In totaal duurt de test slechts enkele minuten.

Uitvoering

Onder de huid van uw linker onderarm wordt een kleine hoeveelheid vloeistof ingespoten. Wanneer u besmet bent met tbc, heeft uw lichaam afweerstoffen tegen tbc-bacteriën aangemaakt. Deze afweerstoffen reageren op de ingespoten vloeistof. Er ontstaat dan een kleine huidreactie, die maximaal is na 3 dagen. De test is dan positief.

Het aflezen van de test moet 3 tot 5 dagen na het inspuiten van de testvloeistof plaatsvinden.

Niet alleen een recente of vroeger doorgemaakte besmetting met tbc geeft een positieve mantouxtest. Ook een vroegere inenting tegen tbc (BCG-vaccinatie) geeft een positieve uitslag. Als u eenmaal positief bent getest, dan blijft de test positief, ook na een behandeling met medicijnen. De afweerstoffen blijven namelijk in uw lichaam aanwezig en zorgen daardoor altijd voor een reactie.

Na de test

Nadat de vloeistof in uw onderarm is ingespoten krijgt u de opdracht om na 3 tot 5 dagen naar uw huisarts te gaan om de reactie af te laten lezen. Vervolgens vult u de brief in die u meekrijgt en stuurt u deze retour naar de afdeling Longfunctie. De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend arts.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen, tel. (050) 524 5392.

Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 5245

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl

