

Heeft u diabetes en gebruikt u hiervoor medicijnen dan geldt het volgende:

Bij tablet gebruik voor glucose regulatie

- Dag voor onderzoek: s'avonds uw tablet(ten) niet innemen.
- Dag van onderzoek: voor het onderzoek uw tablet(ten) niet innemen.

Bij GLP1/incretines

- Zoals: Exenatide (Byetta® of Bydureon®); Liraglutide (Victoza®), Dulaglutide (Trulicity®) of Lixisenatide (Lyxumia®).
Deze medicatie kunt u door gebruiken.

Bij insuline

- Langwerkende insuline op de avond voor onderzoeksdag: normale hoeveelheid spuiten.
- Langwerkende insuline op de ochtend van onderzoeksdag: normale hoeveelheid spuiten.
- Kortwerkende (maaltijd) insuline: niet spuiten als u géén maaltijd mag gebruiken.
- Mengselinsuline, zoals:
novo mix 30; novo mix 50; humalog mix 25, humuline 30/70.
- Avond voor onderzoeksdag: een derde deel van uw hoeveelheid eenheden spuiten.
- Ochtend van onderzoeksdag: een derde deel van uw hoeveelheid eenheden spuiten.

Bij een insulinepomp

Als u geen maaltijd mag gebruiken, dan geen insuline bolus toedienen.
Overleg met uw eigen diabetesverpleegkundige over mogelijke tijdelijke aanpassingen van uw basaal insuline dosering.

Na het onderzoek

Wanneer u weer gaat eten, kunt u uw diabetes medicatie weer nemen of spuiten.

Neemt u bij vragen altijd contact op met de diabetesverpleegkundige.
Telefonisch spreekuur van 8:30 tot 9:30 uur. Telefoon (050) 524 5835.

Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 5245

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
Groningen

www.martiniziekenhuis.nl



12-2015

1522420