

# Reumatologie Martini Ziekenhuis Groningen

## Patiënteninformatie Sulfasalazine (Salazopyrine®)

Sulfasalazine behoort tot de groep van reuma-remmende middelen. Dat betekent dat deze middelen in staat zijn de activiteit van het reumaproces zelf af te remmen. Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. Het onderdrukken van de klachten (pijn en stijfheid), verschijnselen (gewrichtszwelling) en het verbeteren van de algemene conditie.
2. Het beperken van de gewrichtsbeschadiging.

### Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van dit geneesmiddel ook altijd de officiële bijsluiter goed te lezen.

### Hoe kunt u dit geneesmiddel het beste innemen?

Tijdens de eerste twee weken van uw behandeling krijgt u steeds wat meer Sulfasalazine (500 mg tabletten).

Dit gaat volgens schema:

- 1<sup>e</sup> week 1000 mg dd (1 's ochtends en 1 's avonds)
- 2<sup>e</sup> week 1500 mg dd (2 's ochtends en 1 's avonds)
- 3<sup>e</sup> week en verder 2000 mg dd (2 's ochtends en 2 's avonds)

De tabletten na de maaltijd innemen met water. Slik de tabletten in zijn geheel door.

### Moment van werking

Nadat u bent gestart met het gebruik van Sulfasalazine, kan het acht tot tien weken duren voordat u zich iets beter voelt. Daarom adviseert uw arts u meestal om naast de Sulfasalazine ontstekingsremmende middelen te blijven gebruiken.

### Mogelijke bijwerkingen

- misselijkheid
- huiduitslag
- ontsteking van het mondslijmvlies (afters)
- stoornissen in de bloedaanmaak, die op den duur klachten kunnen veroorzaken zoals blauwe plekken en verhoogde kans op infecties
- tijdelijk verminderde vruchtbaarheid bij mannen
- uw urine kan oranje-rood kleuren, hierover hoeft u zich geen zorgen te maken

### Controles

Om in een vroeg stadium eventuele bijwerkingen te kunnen opsporen vinden er regelmatig bloedcontroles plaats: de eerste drie maanden één keer per twee weken, daarna één keer per drie maanden. Uw huisarts wordt, via een huisartsenprotocol gevraagd deze controles op zich te nemen. Als u uw bloed niet zoals afgesproken laat controleren, verzoeken wij u dringend om geen Sulfasalazine te gebruiken.

### Zwangerschap en borstvoeding

Sulfasalazine kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de ongeboren baby volgens het voorschrift worden gebruikt. Als u zwanger wil worden, dan is het wel verstandig om dit met uw behandelend arts te bespreken. De dosering kan dan eventueel in de loop van de zwangerschap worden aangepast. Borstvoeding is toegestaan als de dosering niet hoger is dan 2000 mg per dag.

**Fertiliteit**

Bij het gebruik van sulfasalazine kan het zijn dat er een verminderde zaadcelproductie en mannelijke onvruchtbaarheid is. Dit herstelt binnen twee of drie maanden na het stoppen met de medicatie.

**Operaties en tandheelkundige ingrepen**

Bij operaties en tandheelkundige ingrepen hoeft u niet te stoppen met Sulfasalazine.

**Vaccinatie**

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Tevens wordt 1x per 5 jaar een pneumococcenvaccinatie aanbevolen. Dit kunt u via de huisarts regelen. De pneumococcenvaccinatie kan wel kosten met zich meebrengen. Wanneer u vaccinaties denkt nodig te hebben, voor verre reizen, dan verwijzen wij u door naar de GGD.

**Bron**

- Farmacotherapie Kompas
- NVR richtlijn Sulfasalazine 2002
- DREAM 2007