

REUMATOLOGIE MARTINIZIEKENHUIS GRONINGEN

PATIENTENINFORMATIE BELIMUMAB (Benlysta®) injectie

Belimumab kan voorgeschreven worden aan patiënten met systemische lupus erythematoses. Het wordt gebruikt als andere medicijnen onvoldoende helpen.

Hoe werkt belimumab?

Belimumab is een medicijn dat ervoor zorgt dat bepaalde witte bloedcellen (de B-lymfocyten) minder lang leven. Deze B-lymfocyten zijn onderdeel van het afweersysteem. Het zijn verdedigers tegen ongewenste infecties. Ze spelen ook een rol bij verschillende auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis en SLE. Er is dan soms sprake van een overmatige activiteit van de B-lymfocyten. Vermindering van het aantal B-lymfocyten kan daarom de ziekte tot rust brengen.

Hoe wordt belimumab toegediend?

Belimumab is een medicijn dat toegediend wordt door middel van een injectiepen. De injectie wordt 1x per week (200mg) toegediend onder de huid. In principe kunt u deze injecties zelf in de thuissituatie spuiten. U ontvangt hiervoor een instructie. Is het zelf spuiten bezwaarlijk dan kan de assistente van de huisarts of een thuiszorgverpleegkundige dit doen.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog of apotheker.

Moment van werking

Na drie maanden kunt u de werking van het medicijn vernemen. Na een half jaar moet het maximale effect bereikt zijn.

Mogelijke bijwerkingen?

De meest voorkomende en/of belangrijke staan hieronder beschreven:

In sommige gevallen:

- Misselijkheid, diarree
- Infecties
- Depressie, suïcidale gedachten of zelfverwonding

In zeldzame gevallen:

- Allergische reacties: in het algemeen mild tot matig en soms ernstiger, in zeldzame gevallen. De symptomen van deze reacties zijn meestal uitgebreide huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of lage bloeddruk. *Bij deze symptomen moet u met spoed contact opnemen met uw huisarts of de polikliniek.*

Als u ernstige bijwerkingen heeft moet u stoppen met de belimumab en zijn er extra maatregelen nodig. Neem daarom contact op met een arts bij:

- Depressie, suïcidale gedachten of zelfverwonding
- Ernstige benauwdheid of duizeligheid
- Verminderd bewustzijn
- Koorts

- Koude rillingen
- Verschijnselen van een infectie, zoals ziek zijn, koorts, (toename van) hoesten met opgeven van slijm, pijn bij plassen, aanhoudende diarree.

Wanneer mag het niet worden gegeven?

- Bij infecties
- Vrouwen: Als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.

Als u twijfelt of u een infectie heeft, dient u te overleggen met uw huisarts.

In geval van infectie moet het toedienen van de injectie tenminste 2 weken uitstellen. U moet dan contact opnemen met de reumaconsulente: 050-5246955.

Wat is het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding?

Voor mannen:

Voor zover nu bekend is, heeft belimumab geen invloed op de vruchtbaarheid. Mannen met een kinderwens mogen belimumab gebruiken echter er zijn geen gegevens over de effecten van belimumab op de vruchtbaarheid.

Voor vrouwen:

Voor zover nu bekend is, heeft belimumab geen invloed op de vruchtbaarheid. Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te vertellen als u zwanger wil worden of al zwanger bent. Belimumab kan de afweer bij het ongeboren kind beïnvloeden. Vrouwen moeten vier maanden voor een eventuele zwangerschap stoppen met het gebruik van belimumab. Het is niet bekend of belimumab aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind kan veroorzaken. Daarom mag u tijdens een zwangerschap geen belimumab gebruiken. U mag belimumab ook niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het geven van borstvoeding wordt ook ontraden aan vrouwen die minder dan 4 maanden geleden belimumab hebben gebruikt. Overleg de situatie met uw reumatoloog. Het is dus belangrijk om tijdens het gebruik van belimumab tot en met 4 maanden na het stoppen van belimumab een betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken.

Operaties of tandheelkundige ingrepen ondergaan?

Het gebruik van belimumab kan een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing geven. Het advies is om te overleggen met uw behandelaar als u geopereerd moet worden.

Vaccinaties

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Tevens wordt 1x per 5 jaar een pneumococcenvaccinatie aanbevolen. Dit kunt u via de huisarts regelen. De pneumococcenvaccinatie kan wel kosten met zich meebrengen.

Denkt u vaccinaties nodig te hebben in verband met verre reizen? Overleg dan met de GGD.

Bron

- Bijsluiter Belimumab (Benlysta®) GlaxoSmithKline BV
- Patiënteninformatie Belimumab-Benlysta Academisch Medisch Centrum Amsterdam
- Farmacotherapeutisch Kompas/Zorginstituut Nederland

Feb 2020