



Reumatologie Martini Ziekenhuis Groningen

Patiënteninformatie Tocilizumab (RoActemra®)

Infuus

Tocilizumab behoort tot de groep van reuma-remmende middelen dat wil zeggen, dat deze middelen in staat zijn de activiteit van het reumaproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. Het onderdrukken van de klachten (pijn en stijfheid), verschijnselen (gewrichtszwelling) en het verbeteren van de algemene conditie
2. Het beperken van de gewrichtsbeschadiging.

Tocilizumab wordt aan u voorgeschreven omdat andere medicijnen, die uw reumatoloog u tegen deze ziekte al eerder voorschreef, niet voldoende effectief zijn of omdat u ze niet kunt verdragen.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen.

Hoe werkt Tocilizumab (Roactemra®)?

Tocilizumab is een medicijn dat zich richt tegen de receptor van interleukine-6 (Il-6), waardoor de werking van Il-6 wordt geremd. Il-6 speelt een rol bij veel ontstekingsziekten, zoals chronisch gewrichtsreuma. Over de veiligheid van het middel bij reumatoïde artritis zijn beperkte gegevens beschikbaar. De rol bij het ontwikkelen van kanker is niet bekend. Patiënten die met Tocilizumab behandeld worden dienen een speciale waarschuwingskaart bij zich te dragen.

Hoe wordt Tocilizumab toegediend?

Tocilizumab wordt gegeven via een infuus in de ader in een dosering van 8 mg per kilogram lichaamsgewicht, eenmaal per vier weken. De duur van het infuus is ongeveer een uur.

De infusen worden in dagbehandeling op 1C gegeven. Tijdens het infuus wordt u geobserveerd en zal uw bloeddruk en hartslag regelmatig worden gecontroleerd. In geval van optredende bijwerkingen is het mogelijk om de toediening tijdelijk stop te zetten. Zijn er in deze tijd geen ernstige bijwerkingen? Dan kunt u daarna naar huis.

Moment van werking

Het aanslaan van de behandeling met Tocilizumab is vrij snel, vaak al binnen twee weken. Vaak verbetert de reactie nog weer na elk volgend infuus.

Mogelijke bijwerkingen

- toename van de bovenste luchtweginfecties, keelontsteking
- hoofdpijn
- verhoogde bloeddruk
- leverfunctiestoornissen en stijging van vetten in het bloed, o.a. het cholesterol en verlaging van de witte bloedcellen.
- allergische reacties tijdens of na toediening van Tocilizumab
- zweertjes in mond, uitslag rondom de lippen (herpes)
- duizeligheid (bij duizeligheid wordt u geadviseerd om geen auto te besturen of machines te bedienen).
- maagklachten
- jeuk en huidontstekingen soms met koorts en rillingen

Wanneer u bepaalde klachten ervaart na een infuus, aarzel dan niet en neem contact op met de behandelend reumatoloog.



Belangrijke adviezen

Het gebruik van Tocilizumab wordt afgeraden bij een infectie of abscessen. Vaak hebt u geen koorts wanneer u een infectie heeft. Als u twijfelt of u een infectie heeft, overleg dan met uw huisarts. Heeft u een infectie? Dan is het van belang om de injectie uit te stellen totdat de infectie over is. Neemt u dan zelf contact op met de reumaconsulent of afdeling 1C.

Controles

De eerste zes maanden moet u elke maand uw bloed laten prikken. Daarna 1x per 3 maanden.

Zwangerschap en borstvoeding

De gevolgen van Tocilizumab voor de zwangerschap zijn niet bekend, daarom wordt het gebruik van Tocilizumab afgeraden bij kinderwens (ook bij mannen). Het is van belang om een zwangerschap te voorkomen tijdens het gebruik van Tocilizumab. Anticonceptie tijdens het gebruik van Tocilizumab is van belang tot en met zes maanden na de laatste dosering. Indien u zwanger wordt tijdens de behandeling, waarschuw dan uw arts. Het is onbekend of Tocilizumab overgaat in de moedermelk. Borstvoeding wordt dan ook afgeraden.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Een voorgenomen operatie of tandheelkundige ingreep moet bij voorkeur plaatsvinden twee maanden vooraf aan het volgend infuus. Als dat niet mogelijk is, wordt u geadviseerd om met de chirurg of tandarts te overleggen of u onder bescherming van een antibioticum geholpen moet worden. Het volgende infuus mag volgens het schema weer worden gegeven als de wond goed genezen is en geen tekenen van infectie (meer) vertoont.

Vaccinatie

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Denkt u vaccinaties nodig te hebben voor verre reizen, overleg dan met de GGD.

Bron

- Standpunt Tocilizumab (voorlopige behandelingrichtlijn) NVR 2009
- Bijsluiter; informatie voor de gebruik(st)er; Roche Nederland B.V.
- NVR Biologicals richtlijn verantwoordelijk gebruik van biologicals jan. 2011/update 2014